

	% BADANYCH (N = 100)		% BADANYCH (N = 100)
CZAS TRWANIA NADWRAŻLIWOŚCI		RODZAJ SZCZOTECZKI DO ZĘBÓW	
od lat	54	manualna	63
od kilku miesięcy	29	elektryczna	37
od kilku tygodni	10	METODA SZCZOTKOWANIA ZĘBÓW	
od kilku dni	7	okrężna	52
WCZEŚNIEJSZE LECZENIE NADWRAŻLIWOŚCI		wymiatania	26
nie	82	szorowania	22
tak	18	RODZAJ STOSOWANEJ PASTY	
CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOŻYWANIA SŁODKICH PRZEKĄSEK		„zwykła”	43
sporadycznie	57	do zębów nadwrażliwych	30
raz dziennie	31	wybielająca	23
kilka razy dziennie	12	na choroby dziąseł	3
CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOŻYWANIA SŁODKICH NAPOJÓW		bez fluoru	1
sporadycznie	74	WCZEŚNIEJSZE WYBIELANIE ZĘBÓW	
raz dziennie	16	nie	88
kilka razy dziennie	10	tak	12
LICZBA POSIŁKÓW DZIENNE		BRUKSIZM	
5 i więcej	10	nie	61
4	35	tak	39
3	45	PALENIE PAPIEROSÓW	
2	9	nie	93
1	1	tak	7