

## Czynniki ryzyka ONJ

<b>Choroby ogólnoustrojowe</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– pacjenci leczeni bisfosfonianami z powodu nowotworu (kwas zoledronowy)</li><li>– typ nowotworu</li></ul>
<b>Czas trwania leczenia</b>	im dłuższy czas trwania leczenia, tym większe ryzyko rozwoju martwicy kości
<b>Leczenie chirurgiczne w obrębie jamy ustnej</b>	przeprowadzona ekstrakcja zęba
<b>Anatomia</b>	częstsze występowanie w żuchwie
<b>Współistniejący stan zapalny w jamie ustnej</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– choroba przyzębia</li><li>– zapalenie tkanek okołowierzchołkowych</li></ul>
<b>Płeć</b>	kobiety
<b>Współistniejące choroby</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– niedokrwistość</li><li>– cukrzyca</li><li>– uzależnienie od tytoniu</li><li>– nadczynność tarczycy</li><li>– choroby nerek (dializy)</li><li>– alkoholizm</li></ul>
<b>Czynnik genetyczny</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– SNPs (<i>single nucleotide polymorphism</i>) w genie RBMS3 – związany z gęstością kości i formowaniem kolagenu</li></ul>