

Analizowany parametr	Ustalenia
Problemy z utrzymaniem alignera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 84% pacjentów miało problemy z „zauważalnym odsunięciem” wykryte przez DM w trakcie leczenia, średnio 12,6 odsunięcia na pacjenta,</li> <li>• 42% pacjentów straciło w pewnym momencie podczas leczenia zaczepy, średnio 2,15 zaczepów na pacjenta podczas leczenia,</li> <li>• 21% pacjentów straciło zapięcie w którymś momencie leczenia, przy czym średnio na jednego pacjenta przypada 1,9 straconego zapięcia</li> </ul>
Kwestie związane z higieną	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15% pacjentów miało problemy z zapaleniem dziąseł podczas leczenia</li> </ul>
Komunikacja z gabinetem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 91% pacjentów skorzystało z funkcji czatu, aby wysłać wiadomość bezpośrednio do gabinetu, średnio 8,8 wiadomości na pacjenta</li> </ul>
Stosowanie się do zaleceń	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 75% pacjentów wykonało swoje skany w terminie, a tylko 0,5% spóźniło się o ponad dwa tygodnie z wykonaniem skanów, co wskazuje na wysoki poziom stosowania się do zaleceń</li> </ul>